

Die SELEKT-Formeln sind für die Abgabe mit einem SELEKT-Pump-Drencher in den Pansen vorgesehen.

1. Verwenden Sie bei leichter Dehydratation einen Beutel SELEKT Fresh Cow 500, SELEKT Off Feed oder SELEKT Restore in 20 Litern warmem Wasser. Verwenden Sie bei mäßiger Dehydratation einen zusätzlichen Beutel SELEKT Restore in zusätzlichen 20 Litern. Verwenden Sie bei starker Dehydratation zwei zusätzliche Beutel SELEKT Restore in weiteren 40 Litern. Verwenden Sie niemals zwei Beutel SELEKT Fresh Cow 500 oder SELEKT Off Feed und verwenden Sie niemals die beiden Produkte zusammen.
2. Bei akuter Pansenazidose sollte ein Beutel SELEKT Antacid in 20 Litern warmem Wasser für erwachsene Rinder und proportional weniger für unreife Tiere verwendet werden.
3. SELEKT Glycerol Plus sollte mit mindestens der gleichen Menge an warmem Wasser und vorzugsweise mit dem 10-fachen des eigenen Volumens oder mehr verabreicht werden. Es trägt keinen gelösten Stoff bei, sodass bei Verwendung mit einer Lösung einer anderen SELEKT-Formel kein zusätzliches Wasser erforderlich ist.

	SELEKT Antacid	SELEKT Charbon Fluide™ Aktivkohleflüssigkeit	SELEKT Fresh Cow 500	SELEKT Glycerol Plus	SELEKT Off Feed	SELEKT Restore
<b>Akute Pansenazidose</b>	✓					
Nach <b>Kaiserschnitt</b>			✓	✓		
<b>Durchfall</b> durch Mykotoxine oder bakterielle Infektionen		✓				✓
<b>Dehydratation, Hitzestress</b> oder <b>endotoxämischer Schock</b> durch Mastitis, Metritis, traumatische Retikulitis, Hydrops usw						✓
<b>Appetitlosigkeit</b> in der frühen Laktation					✓	
Reduzierung des <b>Ketoserisikos</b>			✓			
Erholung von <b>Ketose</b>				✓		✓
Nach Korrektur der <b>Verlagerung des Abomasums nach rechts oder links</b>				✓	✓	✓
Verringerung des Risikos einer <b>Verlagerung des Abomasums nach links</b>			✓			
Verringerung des Risikos für <b>Milchfieber, Hypokalzämie und Mycotoxinen</b>			✓			
<b>Vergiftung</b> durch Eichel, Jakobs-Greiskraut, Wasserfenchel usw.		✓				