



VOORBEREIDING OP DE DROOGSTANDPERIODE

Reinig en bereid de uier voor door 4-8 weken voor het droogzetten **Extra Tablet** en **Aspi Tablet** in te brengen.

Dit heeft de volgende voordelen:

- Behoud SCC-niveau in nieuwe lactatie
 - Behoud van melkqualiteit
 - Vermindering van nieuwe IMI
- Vergeleken met BDCT¹³.



SLEUTELS TOT SUCCES:

- Dien het product niet toe aan dieren die ziekteverschijnselen vertonen.
- Gebruik geen andere methoden om de melkproductie te verlagen
- Verminder het krachtvoer niet
- Vermijd het opnieuw toedienen van het product in geval van melkverlies.
- Zorg ervoor dat de koeien toegang hebben tot vers water en voer
- Droogstand minimaal 45-60 dagen



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie over het toedienen van StopLac.



HOE STOPLAC GEBRUIKEN

Dien bij droogzetten eenmaal per dier 4 AHV StopLac Tabletten oraal toe binnen 2 uur na de laatste melkbeurt, met behulp van de AHV-bolusschieter, nadat eerst de folie is verwijderd. AHV StopLac Tabletten zijn verkrijgbaar per kartonnen doos van 40 stuks.

- Houd dieren buiten zicht- en gehoorbereik van de melkstal of robot
- Minimaliseer stress rond droogstand
 - Bekap de hoeven niet rond de droogstandperiode
 - Beperk verplaatsingen tot een minimum
 - Zorg dat de box niet te vol staat
- Houd de voer- en wateropname twee dagen na het droogzetten goed in de gaten om er zeker van te zijn dat het voldoende is

¹ (Steenefeld et al., 2019) ² (Silanikove et al., 2013) ³ (O'Hara, 2019) ⁴ (De Prado-Taranilla et al., 2020) ⁵ (Hamed & Kamel, 2021) ⁶ (Lipkens, 2019) ⁷ (Todhunter et al., 1991) ⁸ (Smith et al., 1985) ⁹ (Bradley & Green, 2004) ¹⁰ (Abad et al., 2016) ¹¹ (Delhez, 2025) ¹² (Cattaneo et al., 2023) ¹³ (Keohane, 2024)

Volg ons op social media voor het laatste nieuws en promoties

#DryBetter |     

AHV International // Schokkerweg 10 // 8042 PC Zwolle, The Netherlands // Tel. +31 (0)38 - 3030127 // info@ahvint.com // www.ahvint.com

Een betere droogstand is slechts één telefoontje van je verwijderd!



STOPLAC TABLET



BESCHERM HAAR UIER OM UW WINSTGEVENDHEID TE GARANDEREN

VOORDELEN

- | Vermindert tijdelijk de melkproductie
- | Minder uierverzadiging en melklekken na het droogzetten
- | Verbeterd de uier- en metabolische gezondheid tijdens de gehele transitieperiode


www.ahvint.com // #DryBetter



FEITEN & CIJFERS | DROOGZETTEN

HET RISICO	DE KOSTEN	DE GEVOLGEN
Verminder de energie vóór het droogzetten om de melkgift te verlagen	€40/koe ¹	Verhoogd risico op stofwisselingsproblemen bij het droogzetten en verminderde immuniteit ¹
Vermindering van het aantal melkbeurten voor het droogzetten om de melkgift te verminderen	€20/koe ¹	Verhoogd celgetal ¹
Duur droogstand < 45 of > 60 dagen	€180-350/koe	Lagere melkgift in volgende lactatie (3-6 kg/d) Meer stofwisselingsproblemen ³
30-40% van de koeien lekt melk ⁴	€150/koe	Kans op intramammaire infecties 6 keer hoger tijdens de droogstand en 1,5 keer hoger tijdens de lactatie ⁴
Tussen 19,0% en 22,4% van de koeien krijgt een nieuwe IMI als Blanket Dry Cow Therapy (BDCT) wordt toegepast	€450/geval ⁵	1/3 van de intramammaire bacteriële infecties herstelt niet en 11,4% van de koeien blijft chronisch tijdens de droogstandperiode ⁶

RISICO OP NIEUWE INFECTIES TIJDENS DE NIEUWE LACTATIECYCLUS



Figuur 1. Het aantal nieuwe intramammaire infecties (IMI) tijdens de lactatiecyclus. Na het afdrogen is de piek in nieuwe infecties aanzienlijk hoger bij koeien die geen enkele vorm van droogzettherapie krijgen.^{6,7,8}



WIST JE DAT...

60% VAN DE UIERGEZONDHEIDSPROBLEMEN HUN OORSPRONG VINDEN IN DE DROOGSTANDPERIODE?⁹



HOE STOPLAC WERKT

StopLac werkt door de pensfermentatie te wijzigen en de productie van vluchtige vetzuren te verminderen. Hierdoor wordt de pensfermentatietijd snel teruggebracht van 500 naar 350 minuten gedurende maximaal 12 uur, waardoor de voedingsstoffen voor de melkproductie worden beperkt¹⁰.

UIERGEZONDHEID BIJ DROOGSTAND

- › Lagere pH creëert een minder gunstig milieu voor bacteriële groei
- › Verlaag het lactosegehalte om de beschikbare voedingsstoffen voor bacteriële groei effectief te verminderen
- › Vermindert de bacteriële belasting

METABOLISCHE GEZONDHEID ROND HET AFKALVEN

- › Lagere eiwitafbraak
- › Lagere vetafbraak
- › Dit vermindert het risico op stofwisselingsproblemen en melkziekte¹²



Vermindert het optreden van melklekken met

~75%¹¹



VOORDELEN



VERBETERD MANAGEMENT

- › Abrupt droogzetten voor alle koeien
- › In lijn met wetgeving
- › Optimale droogstandsduur



VERBETERDE UIERGEZONDHEID

- › Minder kans op melkverlies
- › Lager risico op nieuwe intramammaire infecties
- › Lager celgetal



VERBETERD WELZIJN

- › Optimale voeropname behouden
- › Minder risico op metabole stress rond het afkalven
- › Betere start van de nieuwe lactatie

"Ik ben ongelooflijk enthousiast over StopLac en zijn potentieel om het droogzetproces te revolutioneren, waardoor het soepeler, stressvrij en efficiënter wordt voor veehouders en koeien."

Gertjan Streefland

DVM, Oprichter, Chief Scientific Officer AHV International

