



Maggots®

Larvicide in oplosbare korrels.

Gebruik

MAGGOTS® werkt tegen larven van huisvliegen en Stomoxys in veehouderijen. Controleer altijd de toelating voor de specifieke toelatingsgebieden.

MAGGOTS®, op basis van cyromazine, remt de vervelling van larven die niet kunnen veranderen in volwassen larven en sterven.

Het heeft geen effect op volwassen vliegen.

Voor professioneel gebruik in gebouwen

Toepassingsmethoden

Het product kan worden toegepast op strooiselbakken, mestputten, troggen en voorkuilen:

Met een gieter : 250 g per 10 m² in 10 L water. Voor een licht vochtig oppervlak*.

Sproeien : 250 g per 10 m² in 1 tot 4 liter water. *

Droge toepassing : 250 g per 10 m². Voor vloeibare of zeer vochtige oppervlakken

Toepassingsfrequentie

De aanbevolen tijd tussen behandelingen hangt af van de beheers in huisvestings-systemen en de klimaatomstandigheden. Dit kan variëren van 2-3 weken tot enkele maanden. Vaak is 1 behandeling per 6 weken voldoende. Het effect van de behandeling zal niet onmiddellijk worden waargenomen vanwege het werkingsmechanisme van het product. Het maximum aantal behandelingen mag niet worden overschreden:

- **Pluimvee(kippen)**: 1 behandeling per jaar
- **Pluimvee(eenden, ganzen en kalkoenen)**: 4 behandelingen per jaar
- **Melkvee**: 4 behandelingen per jaar
- **Rundvee(met uitzondering van vleeskalveren)**: 4 behandelingen per jaar

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Bij een ongeval of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren, buiten bereik van kinderen en uit de buurt van voedsel en drank, inclusief diervoeder, bewaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen. Restanten niet in de riolering deponeren of op een plaats waar het op het eigendom van derden kan terechtkomen.

MAGGOTS® kan worden toegepast in de aanwezigheid van dieren door direct contact met dieren tijdens de toepassing te vermijden en door niet in drinkbakken, voederbakken en andere delen die bedoeld zijn om voedsel te verdelen te sproeien.

Opslag

Bewaren in goed gesloten originele verpakkingen op een koele, droge, goed geventileerde plaats.



SAMENSTELLING

Cyromazine 20 g/kg
(2% m/m, CAS 66215-27-8)

WAAR TE GEBRUIKEN

Op oppervlakken in stallen voor pluimvee, melkvee en rundvee (met uitzondering voor vleeskalveren).

TOEGESTAAN GEBRUIK

Professioneel

DOELORGANISMEN

Musca domestica
(Huisvlieg-Ontwikkelingsstadia:
larven) Stomoxys calcitrans (Stal-
vlieg-Ontwikkelingsstadia:
larven)

REFERENTIE(S)

IN-CYR-70145 : Emmer 5 kg
IN-CYR-70146 : Emmer 25 kg

FTMAGGOTS-BE-NL - MAJMR021024

ARMOSA BV
Biensma 39
9001 XZ Grou

T. +31 0566 624 362
M. info-nl@armosa.eu W. shop.armosa.nl

